



**Campaña de prevención
contra el Dengue**

**Sin criaderos
no hay mosquito**

**Sin mosquito
no hay Dengue**



Aedes Aegypti



San Martín

ESTADO PRESENTE

sanmartin.gov.ar

El Dengue, el Zika y la Chikungunya se contagian por la picadura del mosquito *Aedes Aegypti*

Por eso, eliminar al mosquito en cualquiera de sus etapas de crecimiento es la forma más fácil y segura de frenar estas enfermedades.

Sumate con tu familia a esta campaña de prevención, entre todos podemos hacer algo para evitar el contagio.

mSM

¿Cómo prevenir el dengue?

Las larvas del mosquito se crían en agua limpia estancada, en el interior de nuestras casas, jardines, balcones y terrazas.

Por eso, la medida de prevención más importante es la eliminación de todos los lugares que puedan servir de criaderos.

RECOMENDACIONES

- Evitar, en la medida de lo posible, exponerte al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, que es cuando el mosquito tiene mayor actividad.
- Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y también sobre la ropa. Renová su aplicación cada 3 horas aproximadamente.
- En las niñas y los niños, una persona mayor debe aplicarlo en sus propias manos y después extenderlo sobre la piel de la/el menor, evitando el contacto con los ojos y la boca.
- No usar repelentes en bebés menores de 2 meses.

La prevención es lo más importante y todos somos parte de ella.

ELIMINAR CRIADEROS

No dejemos que se junte agua estancada en nuestras casas.



Quitar objetos que no se usen y que puedan acumular agua (neumáticos, latas, tachos).



Cambiar el agua y limpiar los floreros y bebederos de animales todos los días.



Dar vuelta baldes, palanganas y botellas.



Tapar y limpiar los recipientes que uses para almacenar agua (tanques, barriles, bidones).



Sacar la basura en bolsas, sólo los días de recolección



Desmalezar patios y jardines.



Revisar y limpiar periódicamente canaletas de techos, rejillas y desagües.

SINTOMAS



Fiebre repentina sin causa aparente, dolor de cabeza y detrás de los ojos.



Vómitos persistentes o dolor abdominal intenso.



Dolor muscular y en las articulaciones.



Sarpullido, somnolencia e irritabilidad.



Sangrado de encías y/o nariz.



En embarazadas: sarpullido o ronchas en la piel.

Ante alguno de los síntomas:

- Consultar de **inmediato** al médico.
- **No** tomar aspirinas, ibuprofeno u otros remedios.
- Beber abundante **líquido**.



Centros de Salud y Hospitales

CAPS 3

Independencia 876
Villa Concepción

CAPS 4

Diag. J. V. González 50
José León Suárez

CAPS 5

Ocampo 5023
Villa Zapiola

CAPS 6

Los Pensamientos 5321
Barrio Libertador

CAPS 7

Malvinas Arg. y Calle 2
Independencia

CAPS 8

J. M. Campos 2152
San Andrés

CAPS 9

1º Junta 5745
Billinghurst

CAPS 10

Garibaldi 1897
José León Suárez

CAPS 11

3 de Febrero 2590
San Andrés

CAPS 12

Parravicini 965
Villa Piaggio

CAPS 13

Azuénaga 4061
Villa Lynch

CAPS 14

Mitre 7737
Barrio UTA

CAPS 15

Iberá 7456
Barrio Lanzone

CAPS 16

Pasaje A entre 66 y 68
Villa Zagala

CAPS 17

Obligado 1610
Barrio Necochea

CAPS 19

La Crujía 5815
Villa Libertad

CAPS 20

Paso de la Patria
y Av. Central
Barrio Carcova

CAPS 21

Güemes 2018
Villa Ayacucho

CAPS 22

Debenedetti 8555
Barrio Lanzone

Hospital Municipal Diego Thompson

Mitre y Avellaneda
San Martín

Hospital Local Dr. Alexander Fleming

Av. J. M. de Rosas 4230
José León Suárez

Hospital Local Dr. Enrique Marengo

República 4612
Villa Ballester
